НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ОТРЯДА РЖАНКООБРАЗНЫХ И ДРОФООБРАЗНЫХ ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ УЗБЕКИСТАНА ЗООЛОГИЧЕКОГО МУЗЕЯ САМАРКАНДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ишмурзаева Озода,
Самаркандский государственный университет им. Ш. Рашидов.
Фундукчиев Семен Энверович
Самаркандский государственный университет им. Ш. Рашидов.

Received: 09.10.2025
Revised: 10.10.2025
Accepted: 11.10.2025

Ключевые слова: Красная книга, редкие виды.

Kalit so'zlar: Qizil kitob, noyob turlar.

Key words: Red book, rare species.

Аннотация. Коллекция зоологического музея СамГу богата большой коллекцией животных и среди них большую часть занимает орнитологическая коллекция. В этой коллекции собраны редкие и исчезающие виды птиц занесенные в Красную книгу Узбекистана. В этой статье мы привели виды редких птиц отряда ржанкообразных и дрофообразных.

Annotatsiya. SamGu zoologiya muzeyi kollektsiyasi hayvonlarning katta kolleksiyasiga boy bo'lib, ularning ko'p qismini ornitologik kolleksiya egallaydi. Ushbu kolleksiyada O'zbekistonda kamdan-kam va yo'qolib borayotgan turlar kiritilgan. Ushbu maqolada biz Charadriformes va Bustards tartibdagi noyob qushlarning turlarini taqdim etamiz.

Annotation. The collection of the Zoollogical Museum of SamGU is rich in a large collection of animals and among them the most part is occupiyed by the ornithological collection. Thes collection contains rare and endangered species listed in the Red Book of Uzbekistan. In this article we present species of rare birds of the order Charadriiformes and Bustards.

Введение. Птицы как особый класс позвоночных животных сформировался примерно 80-100 млн лет назад. Наиболее ранние ископаемые остатки веерохвостых птиц имеют возраст около 120-135 млн лет. В ходе эволюции у птиц сформировались сложные формы поведения и взаимосвязей с окружающей средой, что определило огромное многообразие форм представителей этого класса.

Большой веретенник –Limosa limosa. Встречается повсеместно по равнинным водоемам Узбекистана во время весенних и осенних миграций. Литует, видимо, в низовьях Амударьи, на озере Каратерень, Айдаркуле, и низовьях Амударьи. Немногочисленная пролетная птица. Большой веретенник

на пролетах встречается только на водоемах, предпочитает мелководные травянистые участки с тонким илистым грунтом. Весенний пролет в республике приходится на апрель. Осенний пролет начинается со второй половины августа, длится до конца сентября. Питается как различными беспозвоночнымиж;насекомыми, моллюсками и рачками. Большой веретенник на пролетах встречается только на водоемах предпочитает мелководные трявинистые участки с тонким илистым грунтом.В музее иммется 1 экземпляр в в виде тушки, дата сбора 25.05.1974 Абрамов.

Кречетка – Chettusia gregaria (Pallas 1771). Уязвимый, естественно редкий, мигрирующий перелетный вид. В Узбекистане встречается только на пролете. До середины xx века весеннее-осенний пролет проходил широким фронтом через Южное Приаралье, пустыню Кызылкум, Голодную и Каршинскую степь. В настоящее время регистрируется в Айдаре – Арнасайской системе озер и на водохранилищах Тудакуль и Талимаржан. В Самаркандской области, во время весеннего пролета, кречетки встречены А.Н.Богдановым (1956), также добыл ее 4 сентября 1947 г. На Каттакурганским водохранилище. Под Самаркандом вид отмечен М.М.Ахмедовым (1948) 23 сентября 1936. Питается насекомыми и другими мелкими животными. Гнездится группами, часто с другими ржанковыми. Гнездо расположенное на земле, самка откладывает 3-5 яиц. В музее хранится 1 экземпляр кречетки, который был добыт в окрестностях Зерафшана.

Степная тиркушка – Glareola nordmanni. Редкая гнездящийся птица Узбекистана. Степные тиркушки селятся в сухой открытой местности. Предпочитают солончаки с солеными озерами и скудной растительностью. Гнездится обычно на сухих участках с разреженной растительностью, на солончаках возле рек и озер. Жизненное пространство степных тиркушек – это степи со скудной растительностью. Птицы предпочитают ландшафты вблизи степных и солевых озер. На места гнездования прилетает поздно, в конце апреля или начале мая. Нередко гнездится совместно с другими колониальными видами куликов и крачек. Степная тиркушка питается, прежде всего, насекомыми. Птицы достигают половой зрелости, вероятно, уже на первом году жизни. Кладка состоит из 3-4, иногда из 5 яиц. Моногамны. Гнездование происходит чаще в течение мая.

Дрофа – Otis tarda tarda Linnaeus. 1758. Находящийся на грани полного исчезновения, перелетный европейский подвид. В Узбекистане гнездится на плато Устюрт, в пустыне Кызылкум и Каршинской степи. В небольшом количестве остается на зимовку в южном Кызылкуме. В Самаркандской области вид всегда был немногочислен, встречается только в Карнабчуле. О незначительных зимовках в долине Зарафшана выше Самарканда (Маргиланская степь) и в его окрестностях (Агалыксая степь) сообщает А.Н. Богданов (1956). Позже Х.С. Салихбаев (1970), М.М. Остапенко (1964) и Л.С. Степанян (1970) встречали небольшие стайки у северных подножий Нуратау, в низовьях Сурхана и Шерабада. В последние годы общая численность дроф

снизилась настолько значительно, что их зимовки в Узбекистане стали редким явлением. Дрофа питается растительной и животной пищей – травами, зеленью культурных растений. В кладке, как правило, два, реже одно яйцо. Насиживание продолжается 21 – 28 дней. Молодые начинают летать в июне-июле. Осенний пролет – в октябре- ноябре. В музее имеется 1 экземпляр дрофы, который был добыт в 1936 году.

Дрофа красотка – Chlamydotis masqueenii(J.E. Gray 1832). Уязвимый, сокращающийся, перелетный восточный подвид. В Узбекистане гнездится на плато Устюрт, в путыне Кызылкум и Каршинской степи. В небольшом количестве остается на зимовку в южным Кызылкуме. В Самаркандской области вид всегда был немногочислен, встречается только в Карнабчуле. Весенний пролет происходит в феврале – марте. Сезон размножения приходится на март – апрель. В кладке 2-3 яйца, самка насиживает их 21-24 дня. Молодые дрофы начинают летать в июне-июле. Питание дрофы- красотки изучена слабо. Зарегистрировано поедание молодые побегов полыни, плодов каперцов, жуков, кузнечиков и ящериц. В музее хранится 2 экземпляра дрофы-красотки, который добыт в окрестностях Огалык.

Стрепет – Tetrax tetrax (Linnaeus,1758). Уязвимый. Сокращающийся, перелетный вид. Гнездится в центральных и южных районах Узбекистана (Е.Н.Лановенко, Е.А. Филатова, 2019). Регулярно зимуют на юге, перелетают через равнинные районы республики. В небольшом количестве зимует в предгорьях Туркестанского хребта. На пролете изредка встречается в равнинной части Самаркандской области. Численность стрепета сильно сократилась в 1960-1970-х гг., в настоящее время стабилизируется. На зимовке стаи – до нескольких тысяч. Осенью стрепеты держатся обычно на больших люцерниках, хлопковых полях. Весенний пролет проходит в марте – апреле. Осенний – в октябре – ноябре. Питаются растительной пищей и насекомыми. Сезон размножения начинается в апреле. Самка откладывает от 3 до 5 яиц. В музее хранится 1 экземпляр стрепета.

Литература

1. Ахмедов М.М. Охотничье-промысловые птицы Зерафшанской долине // Труды Самарканд. пед. и учич. Инст., 1948.Т.6.- С. 69-90.й.
2.Богданов А.Н. Птицы бассейна реки Зерафшан // Тр.Ин- та зоол. И паразитол. АН УзССР. Ташкент, 1956. Т.5.Ч. 1. С. 107_163.
3.Богданов А.Н. Птицы бассейна реки Зерафшан // Тр. Ин-та зоол. и паразитол. АН РУзССР. – Т., 1956. Т.5. – Ч. – С. 107-163.
4. Лановенко Е.Н., Филатова Е.А. Краснозобая казарка // Красная книга Республики Узбектстан. –Т..Chinor ENK. 2019. Т.II. Животные –С. 204-205.
5.Лановенко Е.Н., Филатова Е.А. Стрепет // Красная книга Республики Узбектстан. –Т..Chinor ENK. 2019. Т.II. Животные –С. 258-259.